

PARTIE I (Rem : partie entièrement recopiée sur EITPE, 1987)

① a) $E_{ij} \cdot E_{hh} = \sum_{g,h} E_{ih}$: fait en classe.

b) $(E_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ est une base de M_n (=base canonique). Si $A = (a_{ij}) \in M_n$,
A s'écrit dans cette base: $A = \sum_{\substack{1 \leq i,j \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} a_{ij} E_{ij}$

c) Si $i \neq j$, $\det(I_n + \lambda E_{ij}) = 1$ (car $I_n + \lambda E_{ij}$ est triangulaire avec des "1" sur la diagonale)

d) Avec $i+j, h+k, j+h$, on a: $(I_n + \lambda E_{ij})(I_n + \mu E_{hk}) = I_n + \lambda E_{ij} + \mu E_{hk} + \lambda \mu \sum_{\substack{1 \leq g,h \leq n \\ g \neq i, h \neq j}} E_{gh} = I_n + \lambda E_{ij} + \mu E_{hk}$

On en déduit: $(I_n + \lambda E_{ij})(I_n - \lambda E_{ij}) = I_n$

donc $I_n + \lambda E_{ij}$ est inversible d'inverse $I_n - \lambda E_{ij}$.

② a) Sant $i \neq j$ et $A = \sum_{h,k} a_{hk} E_{hk}$. Alors $(I_n + \lambda E_{ij}) A = A + \lambda E_{ij} A$

avec $\lambda E_{ij} A = \lambda \sum_{h,k} a_{hk} E_{ij} E_{hk} = \lambda \sum_{h,k} a_{hk} \delta_{jh} E_{ih} = \lambda \sum_{h=1}^n a_{jh} E_{ih}$

Or $\sum_{h=1}^n a_{jh} E_{ih}$ est la matrice dont tous les termes sont nuls, sauf ceux de la i -ième ligne, qui sont ceux de la j -ième ligne de A .

Ainsi, $(I_n + \lambda E_{ij}) A$ est la matrice obtenue à partir de A par l'op: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

b) On trouve de même que la matrice $A(I_n + \lambda E_{ij})$ est celle obtenue à partir de A par l'opération $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$

(on peut faire un calcul semblable, on utilise: ${}^t(A \cdot (I_n + \lambda E_{ij})) = {}^t(I_n + \lambda E_{ij}) {}^t A = (I_n + \lambda E_{ij}) {}^t A$)

et se ramener ainsi au cas précédent)

③ 1^{er} cas: $a_{11}=1$: les opérations $L_i \leftarrow L_i - a_{i1} L_1$ ($2 \leq i \leq n$) et $C_j \leftarrow C_j - a_{1j} C_1$ ($2 \leq j \leq n$) transforment A en une matrice B de la forme $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & B' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$.

D'après ce qui précède, $B = P A Q$ où $P = \prod_{i=2}^n (I_n + a_{i1} E_{i1})$ et $Q = \prod_{j=2}^n (I_n + a_{1j} E_{1j})$ ce qui donne le résultat.

2^{ème} cas: Il existe $i > 1$ tel que $a_{i1} \neq 0$

(2)

Alors, l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1-a_{11}}{a_{11}} L_1$ transforme A en une matrice A' du type précédent. Ainsi, $B = PAQ$, où $P = \prod_{i=2}^n (I_n + a_{1i} E_{1i})$ ($I_n + \frac{1-a_{11}}{a_{11}} E_{11}$) et $Q = \prod_{j=2}^n (I_n + a'_{1j} E_{1j})$, sera du type voulu.

3^e-cas: Il existe $j \geq 2$ tel que $a_{1j} \neq 0$

l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + \frac{1-a_{11}}{a_{11}} C_j$ nous ramène là encore au 1^{er} cas, et on conclut comme ci-dessus.

4^e-cas: $a_{11} \neq 1$ et $\forall i > 2 \ a_{i1} = 0$ et $\forall j > 2 \ a_{1j} = 0$

l'opération (par exemple) $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ (mult. à gauche par $I_n + E_{21}$) nous ramène au 2^e-cas, ce qui achève la démonstration.

(4) • Supposer $r \neq 0$ revient simplement à supposer : $A \neq 0$

• Remarquons également que la multiplication à droite ou à gauche d'une matrice A par une matrice de transvection, donne une matrice A' telle que $\det A' = \det A$ (car le dét. d'une matrice de transvection vaut 1)

• Cas $n=2$

- si la 1^{re} ligne ou la 1^{re} colonne de A n'est pas nulle, la question précédente donne : $\exists P, Q$, produits de matrices de transvection d'ordre 2, tq $P A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = B$ et $\det B = \det A = b$. Cela donne le résultat (le cas $r=1$ correspondant au cas $b=0$)
- sinon, l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$ nous ramène au cas précédent (car $A \neq 0$)

• Supposons le résultat démontré à l'ordre $n-1 \geq 2$, et soit $A \in \mathbb{M}_n$, $\operatorname{rg} A = r \geq 1$.

* Si la 1^{re} ligne ou la 1^{re} colonne de A n'est pas nulle, il existe P, Q, produits de matrices de transvection d'ordre n, tq $P A Q = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B' \end{pmatrix}$

avec $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A = r$ et $\det B = \det B' = \det A$.

On a: $B' \in \mathbb{M}_{n-1}$ et $\operatorname{rg} B' = r-1$.

- si $\operatorname{rg} B' = 0$, i.e. si $r=1$, on a directement le résultat voulu.

- sinon, l'H.R permet d'affirmer qu'il existe P_1, Q_1 , produit de matrices de transvection d'ordre $n-1$, telles que $P_1 B' Q_1 = B_1$ avec :

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \end{pmatrix} \text{ si } \operatorname{rg} B_1 = n-1 \text{ et } B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det B_1 \end{pmatrix} \text{ si } \operatorname{rg} B_1 = n-1 \\ (\text{et } \det B_1 = \det B' = \det A)$$

En notant $P' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P_1 \end{pmatrix}$ et $Q' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & Q_1 \end{pmatrix}$, on vérifie alors facilement,

en effectuant le produit par blocs:

$$P' A Q' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P_1 B' Q_1 \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

s.t.: $P' A Q' = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ si $\operatorname{rg} B_1 = n-1$ et $\operatorname{rg} A = n$ et $P' A Q' = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ si non. (3)

On obtient alors le résultat à l'ordre n , en remarquant que si P_2 et Q_1 sont des produits de matrices de transvection d'ordre $n-1$, P' et Q' sont encore des produits de matrices de transvection d'ordre n .

(car, si T est une matrice de transvection d'ordre $n-1$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ 0 & T & \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice de transvection d'ordre n).

* Le cas où la 1^{ère} ligne et la 1^{ère} colonne de A sont nulles se ramène au cas précédent, à l'aide de l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_i$ où L_i est une ligne non nulle de A (il en existe car $A \neq 0$). CQFD.

⑤ D'après ce qui précède, si A est une matrice donnée de déterminant $\neq 1$ (le cas forme bien un sous-gpe de $GL_n(\mathbb{R})$, noté $SL_n(\mathbb{R})$), il existe P, Q , produit de matrices de transvection telles que $I_n = P A Q$ soit $A = P^{-1} Q^{-1}$.

P^{-1}, Q^{-1} étant elles aussi des produits de matrices de transvection, A est donc produit de matrices de transvection.

i.e. $SL_n(\mathbb{R})$ est engendré par les matrices de transvection.

⑥ a) Calculons $A = (I_n + \lambda E_{ij})(I_n + \mu E_{hk})(I_n + \lambda E_{ij})^{-1}(I_n + \mu E_{hk})^{-1}$ en supp. $i \neq j$ et $h \neq k$

$$\begin{aligned} A &= (I + \lambda E_{ij})(I + \mu E_{hk})(I - \lambda E_{ij})(I - \mu E_{hk}) \\ &= (I + \lambda E_{ij} + \mu E_{hk} + \lambda\mu \delta_{jh} E_{ik})(I - \lambda E_{ij} - \mu E_{hk} + \lambda\mu \delta_{jh} E_{ik}) \\ &= I + \cancel{\lambda E_{ij}} + \cancel{\mu E_{hk}} + \cancel{\lambda\mu \delta_{jh} E_{ik}} - \cancel{\lambda E_{ij}} - \cancel{\lambda^2 E_{ij}^2} - \cancel{\lambda\mu \delta_{ik} E_{hj}} - \cancel{\lambda^2 \mu \delta_{jh} \delta_{ik} E_{ij}} \\ &\quad - \cancel{\mu E_{hk}} - \cancel{\lambda \mu \delta_{jh} E_{ik}} - \cancel{\mu^2 E_{hk}^2} - \cancel{\lambda \mu^2 \delta_{jh} \delta_{kh} E_{ik}} + \cancel{\lambda \mu \delta_{jh} E_{ik}} \\ &\quad + \cancel{\lambda^2 \mu \delta_{jh} \delta_{ji} E_{ik}} + \cancel{\lambda \mu^2 \delta_{jh} \delta_{ik} E_{hk}} + \cancel{\lambda^2 \mu^2 \delta_{jh} \delta_{kh} \delta_{ik} E_{ik}} \\ &= I + \cancel{\lambda \mu \delta_{jh} E_{ik}} - \cancel{\lambda \mu \delta_{ik} E_{hj}} - \cancel{\lambda^2 \mu \delta_{jh} \delta_{ik} E_{ij}} + \cancel{\lambda \mu^2 \delta_{jh} \delta_{ik} E_{hh}} + \cancel{\lambda^2 \mu^2 \delta_{jh} \delta_{ik} E_{ik}} \end{aligned}$$

En supposant $i \neq h$, on a: $A = I_n + \lambda \mu \delta_{jh} E_{ik}$

puis, pour $h=j$: $A = I_n + \lambda \mu E_{ik}$

[Il est possible de trouver $(i, j, k) \in [1, n]^3$ tq $i \neq j$, $i \neq k$ et $j \neq k$ car $n \geq 3$]

Il suffit donc ensuite de choisir $i=d$, $k=p$ et $\lambda \mu = a$ pour obtenir $A = I_n + a E_{dp}$

b) Soit $A = I + a E_{dp}$ avec $a \neq 0$ une matrice de transvection, et i, j, h, k, λ, μ comme ci-dessus. On a alors:

$$f(A) = f(I + \lambda E_{ij}) f(I + \mu E_{hk}) f((I + \lambda E_{ij})^{-1}) f((I + \mu E_{hk})^{-1})$$

$$\text{sat } f(A) = f(I + \lambda E_{ij}) f((I + \lambda E_{ij})^{-1}) f(I + \mu E_{hk}) f((I + \mu E_{hk})^{-1}) \quad (4)$$

$$= f[(I + \lambda E_{ij})(I + \lambda E_{ij})^{-1}] f[(I + \mu E_{hk})(I + \mu E_{hk})^{-1}] = f(I_n) \cdot f(I_n)$$

$$\text{Or } f(I_n) = 1 \text{ d'où } \underline{f(A) = 1},$$

(c) Soit $A \in M_n$. Alors, il existe P, Q , produits de matrices de transvection, telles que $B = PAP^{-1}$ sont diagonale, de la forme décrite à la question 4.

$$\text{On a alors } f(B) = \det A \text{ et } f(P) = f(Q) = 1$$

$$(\text{car, si } P = \prod T_i, \text{ on a } f(P) = \prod f(T_i) \dots) \text{ d'où : } \underline{f(A) = \det A}.$$

(Une jolie caractérisation du déterminant, isn't ?)

PARTIE II

(1) cf. cours (à redémontrer lors du concours)

(2) Soit $i \neq j$. $\sigma(E_{ij} E_{ii}) = \sigma(0) = 0$ car σ linéaire

$$\text{d'où } 0 = \sigma(E_{ii} E_{ij}) = \sigma(E_{ij}) : \underline{\text{si } i \neq j, \sigma(E_{ij}) = 0}$$

(b) $\sigma(E_{ij} E_{ji}) = \sigma(E_{ji} E_{ij})$ d'où $\underline{\sigma(E_{ii}) = \sigma(E_{jj})}$ pour tous $(i, j) \in [1, n]^2$

(c) Notons λ la valeur commune des $\sigma(E_{ii})$ pour $1 \leq i \leq n$. Soit $M \in M_n$,

$$M = \sum_{i,j} m_{ij} E_{ij}. \sigma \text{ étant linéaire : } \sigma(M) = \sum_{i,j} m_{ij} \sigma(E_{ij}) = \sum_i \alpha_{ii} \sigma(E_{ii})$$

$$\text{soit } \underline{\sigma(M) = \lambda \text{tr}(M)}$$

(3) Si $A, B \in M_n$, on a $\text{tr}(AB - BA) = 0$ donc $\forall M \in I, \text{tr}(M) = 0$ (car M est

combinaison linéaire de matrices de la forme $AB - BA$, et tr est une forme linéaire)

En notant $I' = \{M \in M_n, \text{tr}(M) = 0\}$, on a donc $I \subset I'$. De plus, $\dim I' = n^2 - 1$ puisque I' est un hyperplan de M_n (noyau d'une f.p. non nulle).

$$\text{donc : } \dim I \leq n^2 - 1.$$

D'autre part : si $i \neq j$: $E_{ij} = E_{ii} E_{ij} - E_{ij} E_{ii} \in I$

$$\text{et } i \in [2, n] \quad E_{11} - E_{ii} = E_{1i} E_{i1} - E_{i1} E_{1i} \in I$$

d'où I contient, en particulier, les $n^2 - 1$ matrices $(E_{ij})_{i \neq j}$ et $(E_{ii} - E_{ii})_{i \geq 2}$.

Ces matrices étant linéairement indépendantes (facile), il en résulte : $\dim I \geq n^2 - 1$.

$$\text{Finalement : } \underline{\dim I = n^2 - 1}$$

(et on a aussi démontré : $I = I'$)

Puisque $I_n \notin I = I'$, la droite vectorielle engendrée par I_n est bien un supplémentaire de I , soit $M_n = I \oplus I_n$.

$$(4) F_{hh}^{-1} F_{ij} F_{hk} = I_n + E_{ij} - \delta_{ih} E_{hj} + \delta_{jh} E_{hi} - \delta_{ih} \delta_{jh} E_{hk} \quad (\text{calcul semblable à celui de I.6.a})$$

(5)

⑤ On a alors:

$$\theta(F_{hh}^{-1} F_{ij} F_{hk}) = \theta(F_{ij} F_{hk} (F_{hk})^{-1}) = \theta(F_{ij}). \text{ D'où :}$$

$$\theta(F_{ij}) = \theta(F_{ij}) - \delta_{ik} \theta(E_{hj}) + \delta_{jh} \theta(E_{ih}) - \delta_{ih} \delta_{jh} \theta(E_{hh})$$

$$\text{soit } \delta_{jh} \theta(E_{ih}) - \delta_{ih} \theta(E_{hj}) - \delta_{ih} \delta_{jh} \theta(E_{hh}) = 0$$

- pour $i=j=h$ et $i \neq k$, on obtient: $\theta(E_{ih})=0$

- pour $i=k, j=h$ et $i \neq j$, on obtient: $\theta(E_{ii}) - \theta(E_{jj}) = \theta(E_{hh}) = 0$

$$\text{soit } \theta(E_{ii}) = \theta(E_{jj})$$

Le résultat cherché en décalé, exactement comme dans la question n°2.

PARTIE III

① * On vérifie d'abord facilement que: A_g est linéaire de $\mathfrak{f}(E)$ dans $\mathfrak{f}(E)$ et que

$$A_g(uv) = A_g(u) \circ A_g(v) \text{ pour tout } (u, v) \in \mathfrak{f}(E)^2 \quad \text{V. D'autre part, si } g \in GL(E), \text{ on a :}$$

$$\forall u \in \mathfrak{f}(E), \quad A_g \circ A_{g^{-1}}(u) = g \circ (g^{-1} \circ u \circ g) \circ g^{-1} = u = \text{Id}_{\mathfrak{f}(E)}(u)$$

$$\text{d'où } A_g \circ A_{g^{-1}} = \text{Id}_{\mathfrak{f}(E)}.$$

Ainsi, A_g est bijective ; c'est donc bien un automorphisme de l'algèbre $\mathfrak{f}(E)$

* Montrons que χ est un morphisme du groupe $(GL(E), \circ)$ dans le groupe $\text{Aut}(\mathfrak{f}(E), \circ)$

i.e.: $\forall g, g' \in GL(E), \quad A_g \circ A_{g'} = A_{g'g}$. Or:

$$\forall u \in \mathfrak{f}(E) \quad A_g \circ A_{g'}(u) = g \circ (g'^{-1} \circ u \circ g') \circ g'$$

$$\text{et } A_{g'g}(u) = g'g^{-1} \circ u \circ (g'g)^{-1} = g'g^{-1} \circ u \circ g'^{-1} \circ g' = g \circ (g'^{-1} \circ u \circ g') \circ g', \text{ d'où l'égalité.}$$

* χ n'est pas injective : voir question 2.b.

② @ Exercice déjà fait en classe.

③ Le noyau de χ est: $\text{Ker } \chi = \chi^{-1}(\text{Id}_{\mathfrak{f}(E)})$

$$\text{soit } \text{Ker } \chi = \{g \in GL(E) \mid g \circ A_g = \text{Id}_{\mathfrak{f}(E)}\}$$

$$= \{g \in GL(E) \mid \forall u \in \mathfrak{f}(E), \quad g \circ u \circ g^{-1} = u\}$$

$$= \{g \in GL(E) \mid \forall u \in \mathfrak{f}(E), \quad g \circ u = u \circ g\}$$

Or si $g \in \text{Ker } \chi$, $x \in E - \{0\}$, H un hyperplan supplémentaire de $\mathbb{R}x$ et u

la symétrie pr. à $\mathbb{R}x$, de direction H. On a $g \circ u = u \circ g$, d'où $g[u(x)] = u[g(x)]$ et $g(x) = u[g(x)]$

$g(x)$ est donc invariant par u, i.e. $g(x) \in \mathbb{R}x$: $\{x, g(x)\}$ est liée (ce résultat démontre d'ailleurs vrai si $x=0$). On en déduit que g est une homothétie.

Réciproquement, il est facile de vérifier que si g est une homothétie ($g = \lambda \text{Id}_E$),

alors $\chi(g) = 0$.

(6)

Ainsi, $\text{Ker } \chi = \{\lambda \text{Id}_E, \lambda \neq 0\}$ ($\lambda \neq 0$ car sinon, $\lambda \text{Id}_E \notin GL(E)$)

Puisque $\text{Ker } \chi$ n'est pas réduit à $\{\text{Id}_E\}$, χ n'est pas injective.

(3) a) • $u_{\varphi,x} \in \mathcal{L}(E)$: facile.

• - si $x=0$: $u_{\varphi,0}$ est l'application nulle

- si $x \neq 0$: $\text{Ker } u_{\varphi,x} = \{y \in E, \varphi(y)x=0\} = \{y \in E, \varphi(y)=0\} = \text{Ker } \varphi$.

• - si $\varphi = 0_E$: $\text{Im } u_{0,x} = \{0\}$

- si $\varphi \neq 0_E$, φ est surjective de E sur \mathbb{R} donc $\text{Im } u_{\varphi,x} = \text{Vect}(\{x\})$

b) - le cas $x=0$ est exclu par l'énoncé; on supposera donc $x \neq 0$

- $u_{\varphi,x}$ projecteur $\Leftrightarrow u_{\varphi,x} \circ u_{\varphi,x} = u_{\varphi,x}$

$$\Leftrightarrow \forall y \in E \quad u_{\varphi,x} [\varphi(y)x] = \varphi(y)x$$

$$\Leftrightarrow " \quad \varphi(y) u_{\varphi,x}(x) = \varphi(y)x$$

$$\Leftrightarrow " \quad \varphi(y)\varphi(x) = \varphi(y)x$$

$$\Leftrightarrow " \quad \varphi(y)\varphi(x) = \varphi(y) \text{ car } x \neq 0.$$

si φ est la forme linéaire nulle, $u_{\varphi,x}=0$: ce cas est exclu.

Donc, il existe $y \in E$ tq $\varphi(y) \neq 0$, et les conditions précédentes s'écrivent: $\varphi(x)=1$.

Ainsi: $u_{\varphi,x}$ projection non nul $\Leftrightarrow \varphi(x)=1$ (car, si $\varphi(x)=0$, on ne peut pas avoir $x=0$ si $\varphi=0$)

(4) • On remarque que: $\forall x \in E \quad u_{e_j^*, e_i^-}(x) = e_j^*(x)e_i^-$

$$\text{dans } \forall k \in [1, n] \quad u_{e_j^*, e_i^-}(e_k) = \delta_{jk} e_i^-$$

Ainsi, la matrice de u_{ij} dans la base (e_1, \dots, e_n) est E_{ij}

Il en résulte immédiatement:

$$\begin{cases} - u_{ij} \circ u_{hk} = \delta_{ih} u_{jk} \\ - (u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \text{ base de } \mathcal{L}(E) \end{cases}$$

(5) a) • \leq est réflexive car: $\forall p \in P, p=p^2$ d'où $p \leq p$

• \leq est antisymétrique car: si $p, q \in P, p \leq q \wedge q \leq p \Rightarrow \begin{cases} p = p \circ q = q \circ p \Rightarrow p = q \\ q = q \circ p = p \circ q \end{cases} \Rightarrow p = q$.

• \leq est transitive car: si $p, q, r \in P$ sont tels que $p \leq q$ et $q \leq r$, on a:

$$p = p \circ q = q \circ p \text{ et } q = q \circ r = r \circ q$$

$$\text{d'où } p = p \circ q = p \circ (q \circ r) = (p \circ q) \circ r = p \circ r \quad \text{d'où } p \leq r$$

$$\text{et } p = q \circ p = (r \circ q) \circ p = r \circ (q \circ p) = r \circ p$$

Ainsi : \leq est bien une relation d'ordre sur \mathcal{P} . (E)

- Soit F un rev de E de dimension ≥ 1 et G un rev de E de dimension ≥ 1 tels que $E = F \oplus G$ (c'est possible car $n \geq 2$). Soit p la projection sur F de direction G et q la projection sur G de direction F .

On a alors $p \circ q = q \circ p = 0$. On ne peut donc avoir ni $p \leq q$, ni $q \leq p$.

Ainsi, \leq est une relation d'ordre partiel.

⑥ i) \Rightarrow ii) Soit p un projecteur de rang 1, et $q \in \mathcal{P}$ tel que $q \leq p$, i.e. $q = q \circ p = p \circ q$.

- si $x \in \text{Ker } p$, $p(x) = 0$ d'où $q(x) = q[p(x)] = q(0) = 0$

- soit $\{a\}$ une base de $\text{Im } p$ ($\text{rg } p = 1$). $q(a) = p[q(a)]$, donc $q(a) \in \text{Im } p$,

d'où $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tq $q(a) = \lambda a$. On a alors: $\forall x \in \text{Im } p$, $q(x) = \lambda x = \lambda p(x)$

- Ainsi, q et λp coïncident sur $\text{Ker } p$ et $\text{Im } p$, supplémentaires. On a donc $q = \lambda p$. Mais alors, l'égalité $q = p \circ q = q \circ p$ donne $\lambda p = \lambda^2 p$ soit $\lambda = 1$ (car les cas $\lambda = 0, p = 0$ sont exclus).

d'où finalement $q = p$: p est minimal.

ii) \Rightarrow i) Soit p un él^et minimal de \mathcal{P} , et $r = \text{rg}(p)$ ($r \geq 1$ car $p \neq 0$).

Soit $(x_1, -x_n)$ une base de E telle que $(x_1, -x_1)$ soit une base de $\text{Im } p$ et $(x_{n+1}, -x_n)$ une base de $\text{Ker } p$ (c'est possible car $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$).

Soit alors q la projection sur $\mathbb{R}x_1$ de direction Vect($\{x_2, \dots, x_n\}$).

Alors:

- $p \circ q(x_1) = p(x_1) = x_1$ et $q \circ p(x_1) = q(x_1) = x_1$

- $\forall i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ $p \circ q(x_i) = p(0) = 0$ et $q \circ p(x_i) = q(0) = 0$

- $\forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket$ $p \circ q(x_i) = p(0) = 0$ et $q \circ p(x_i) = q(0) = 0$.

D'où $q = q \circ p = p \circ q$, soit $q \leq p$. p étant minimal, on a $q = p$, d'où $\text{Im } p = \text{Im } q = \mathbb{R}x_1$ et p est de rang 1.

iii) \Rightarrow i) déconse directement de la question n°3

i) \Rightarrow iii) Soit p un projecteur de rang 1, et $\{x\}$ une base de $\text{Im } p$.

Alors, pour tout $y \in E$, $\exists \lambda_y \in \mathbb{R}$ tq $p(y) = \lambda_y x$

Il est facile de vérifier que l'application $y \mapsto \lambda_y$ est linéaire : notons alors $\lambda_y = \varphi(y)$, avec $y \in E^*$.

On aura donc bien : $\forall y \in E$, $p(y) = \mu_{q,x}(y)$, et $q(x) = 1$ (car $p(x) = x$)

⑥ a) Soit $p \in \mathcal{P}$, alors $A(p) \circ A(p) = A(p \circ p) = A(p)$ et $A(p)$ est non nul car A est un automorphisme. Donc $A(p) \in \mathcal{P}$.

(8)

(b) - On remarque d'abord que, si $p, q \in \mathbb{P}$:

$$p \leq q \Rightarrow p = p \circ q = q \circ p \Rightarrow A(p) = A(p) \circ A(q) = A(q) \circ A(p) \\ \Rightarrow A(p) \leq A(q)$$

- Supposons p minimal, et soit $q \in A(p)$. Alors $A^{-1}(q) \leq p$ (d'après ce qui précède, puisque A^{-1} est aussi un automorphisme d'algèbre), d'où $A^{-1}(q) = p$, soit $q = A(p)$.

Ainsi, $A(p)$ est minimal.

(c) Les applications u_{ii} sont des projecteurs de rang 1, donc des éléments minimaux de \mathbb{P}

D'après ce qui précède, $A(u_{ii})$ est aussi un élément minimal de \mathbb{P} , donc, d'après S., il existe $\varphi_i, \varepsilon_i \in E^* \times E$ tels que: $A(u_{ii}) = u_{\varphi_i, \varepsilon_i}$ et $\varphi_i(\varepsilon_i) = 1$ pour tout i .

(d) • Si $i \neq j$, on a $u_{ii} \circ u_{jj} = 0$ d'où $A(u_{ii} \circ u_{jj}) = A(u_{ii}) \circ A(u_{jj}) = 0$

$$\text{Ainsi: } u_{\varphi_i, \varepsilon_i} \circ u_{\varphi_j, \varepsilon_j} = 0 \text{ d'où } u_{\varphi_i, \varepsilon_i} [u_{\varphi_j, \varepsilon_j} (\varepsilon_j)] = 0$$

$$u_{\varphi_i, \varepsilon_i} [\varepsilon_j] = 0$$

$$\text{sur } \varphi_i(\varepsilon_j) \cdot \varepsilon_i = 0 \text{ d'où } \varphi_i(\varepsilon_j) = 0.$$

$$\text{Ainsi: } \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, \varphi_i(\varepsilon_j) = \delta_{ij}.$$

• On en déduit que $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est linéairement indépendant:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j \varepsilon_j = 0 \Rightarrow \forall i, \varphi_i \left(\sum_j \lambda_j \varepsilon_j \right) = 0$$

$$\Rightarrow \forall i, \sum_j \lambda_j \delta_{ij} = 0 \Rightarrow \forall i, \lambda_i = 0$$

D'où $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de E , et $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ en est la base dual.

(e) a) $A(u_{ij}) \circ u_{\varphi_k, \varepsilon_k} = A(u_{ij}) \circ A(u_{kk}) = A(u_{ij} \circ u_{kk}) = A(0) = 0$ (car $k \neq j$)

• On a donc $\forall k \neq j$ $A(u_{ij}) [u_{\varphi_k, \varepsilon_k} (\varepsilon_k)] = 0$ sur $A(u_{ij})(\varepsilon_k) = 0$.

On en déduit: $\text{Vect}(\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1}, \varepsilon_{j+1}, \dots, \varepsilon_n\}) \subset \text{Ker } A(u_{ij})$, donc $\dim \text{Ker } A(u_{ij}) \geq n-1$.

Mais $A(u_{ij})$ n'est pas nul (car A automorphisme), donc $\dim \text{Ker } A(u_{ij}) \leq n-1$.

Finalement, $\dim \text{Ker } A(u_{ij}) = n-1$, $\text{rg } A(u_{ij}) = 1$

$$\text{et } \text{Ker } A(u_{ij}) = \text{Vect}(\{\varepsilon_k, k \neq j\})$$

(f) $A(u_{ij}) \circ A(u_{ji}) = A(u_{ii})$

$$\text{D'où } A(u_{ij}) [A(u_{ji})(\varepsilon_i)] = A(u_{ii})(\varepsilon_i) = \varepsilon_i.$$

Pour toute, $\varepsilon_i \in \text{Im } A(u_{ij})$ et, puisque $\text{rg } A(u_{ij}) = 1$: $\text{Im } A(u_{ij}) = \text{Vect}(\{\varepsilon_i\})$

(g) On a: $A(u_{ij})(\varepsilon_j) \in \text{Im } A(u_{ij})$. Donc $\exists \lambda_{ij} \in \mathbb{R}$ tq $A(u_{ij})(\varepsilon_j) = \lambda_{ij} \varepsilon_i$

$$\text{sur } A(u_{ij})(\varepsilon_j) = \lambda_{ij} \varphi_i(\varepsilon_j) \varepsilon_i = \lambda_{ij} \cdot u_{\varphi_i, \varepsilon_i} (\varepsilon_j)$$

D'autre part, si $k \neq j$: $A(u_{ij})(\varepsilon_k) = 0$ et $\lambda_{ij} u_{\varphi_j, \varepsilon_i}(\varepsilon_k) = \lambda_{ij} \underbrace{\varphi_j(\varepsilon_k)}_{=0} \varepsilon_i = 0$ (9)

Dans $A(u_{ij}) = \lambda_{ij} u_{\varphi_j, \varepsilon_i}$ (car ces deux endo. coïncident sur la base $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$)
et $\lambda_{ij} \neq 0$ car $A(u_{ij}) \neq 0$ (A automorphisme)

(8) a) $A(u_{ij}) \circ A(u_{jk}) = A(u_{ij} \circ u_{jk}) = A(u_{ik})$

s'or $\lambda_{ij} \lambda_{jk} u_{\varphi_j, \varepsilon_i} \circ u_{\varphi_k, \varepsilon_j} = \lambda_{ik} u_{\varphi_k, \varepsilon_i}$

En appliquant cette égalité à ε_k , puisque $u_{\varphi_k, \varepsilon_i}(\varepsilon_k) = \varphi_k(\varepsilon_k) \cdot \varepsilon_i = \varepsilon_i$ etc...

on trouve : $\lambda_{ij} \lambda_{jk} = \lambda_{ik}$

b) D'où immédiatement : $\lambda_{ij} = \frac{\lambda_{ik}}{\lambda_{jk}}$ puisque $\lambda_{jk} \neq 0$.

(9) a) On a : $\forall x \in E$, $A(u_{ij})(x) = \lambda_{ij} u_{\varphi_j, \varepsilon_i}(x) = \frac{\lambda_{i1}}{\lambda_{j1}} \varphi_j(x) \varepsilon_i$.

Notons alors $x_i = \lambda_{i1} \varepsilon_i$. $\frac{1}{\lambda_{j1}} \varphi_j(x_i) = \delta_{ij}$, donc $x_j^* = \frac{1}{\lambda_{j1}} \varphi_j$

et on a alors : $A(u_{ij}) = u_{x_j^*, x_i}$ ((x_i) est bien une base car $\lambda_{i1} \neq 0$)

b) Notons g l'automorphisme de E tel que $g(e_i) = x_i$ pour tout i

Alors : $\forall k \in \{1, n\}$, $A(u_{ij})(x_k) = x_j^*(x_k) x_i = \delta_{jk} x_i$

et $g \circ u_{ij} \circ g^{-1}(x_k) = g \circ u_{ij}(e_k) = g[u_{\varphi_j, \varepsilon_i}(e_k)]$

$= g[e_j^*(e_k) e_i] = \delta_{jk} g(e_i) = \delta_{jk} x_i$

Alors $A(u_{ij}) = g \circ u_{ij} \circ g^{-1}$ (car coïncident sur la base $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$)

c) Puisque $(u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $\mathfrak{f}(E)$, on en déduit $A = Ag$

i.e. : $\exists g \in GL(E)$ tq $\forall u \in \mathfrak{f}(E)$, $A(u) = g \circ u \circ g^{-1}$.

Autrement dit : tous les automorphismes de l'algèbre $\mathfrak{f}(E)$ sont des automorphismes intérieurs

on encore : l'application $\chi : g \mapsto Ag$ est surjective de $GL(E)$ sur $\text{Aut}(\mathfrak{f}(E))$

(10) D'après la question précédente, il faut déterminer les $\varphi \in \mathfrak{f}(E)^*$ telles que :

$\forall u \in \mathfrak{f}(E)$, $\forall g \in GL(E)$, $\varphi(g \circ u \circ g^{-1}) = \varphi(u)$

Or, pour $\forall v \in \mathfrak{f}(E)$, pour $\forall g \in GL(E)$, il existe $u \in \mathfrak{f}(E)$ tel que $ug^{-1} = v$, soit $u = vg$ - Ce qui précise équivaut donc à :

$\forall v \in \mathfrak{f}(E)$, $\forall g \in GL(E)$ $\varphi(g \circ v \circ g^{-1}) = \varphi(vg)$

D'après la question II.5 : $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\forall u \in \mathfrak{f}(E)$, $\varphi(u) = \lambda \text{tr}(u)$